

Що необхідно знати про кір

Кір - одна з найпоширеніших дитячих інфекцій, яка передається повітряно-крапельним шляхом, інкубаційний період, тобто перебіг хвороби без клінічних проявів, триває до 17 днів.

Хвороба починається гостро, з підвищення температури тіла до 38-39°C, нежиті, кашлю, головного болю, загального нездужання, сипlostі голосу, світлобоязні, одутlostі обличчя, кон'юнктивіту.

На 3-4-й день стан хворого погіршується, температура тіла підвищується до 40°C, за вухами з'являється висипання, яке протягом доби поширюється на обличчя і верхню частину грудей, а наступного дня на тулуб і верхні кінцівки; ще через день - на нижні кінцівки. У хворого на кір червоні очі, повіки потовщені, обличчя одутле, ніс та верхня губа набряклі, є виділення з носа.

При неускладненому перебігу хвороби температура тіла нормалізується, висипання блідне, поступово перетворюючись у світло-коричневі пігментовані плями, зникають катаральні явища та симптоми інтоксикації. З введенням протикорового імуноглобуліну, а також із запровадженням активної імунізації важкі форми кору стали зустрічатись дуже рідко.

Захворювання на кір триває 10-15 днів і, при відсутності ускладнень, закінчується одужанням.

Кір досить часто обтяжується різними ускладненнями. Він небезпечний, насамперед тим, що здатний різко знижувати захисні сили дітей, особливо маленьких. Це, в свою чергу, відкриває шлях до бактеріальної інфекції, яка найчастіше викликає запалення легень або вуха. Крім того, кір може ускладнюватись запаленням рогівки ока, ясен, гортані, кишечнику, шкіри. Найбільш важкі ускладнення – неврологічні (запалення оболонок головного та спинного мозку).

Єдиним ефективним заходом запобігання захворювання кором є вакцинація. Проведення специфічної вакцинопрофілактики проти кору дозволило знизити захворюваність у десятки разів. Якщо дитина, яка була щеплена, усе ж захворіє, вона переносить кір значно легше, ніж нещеплена. Хвороба проходить без небезпечних ускладнень.

При перших ознаках кору необхідно звернутись до лікаря!

