

Всі діти з позитивною реакцією Манту мають бути обстежені на туберкульоз іншими методами, незалежно від того, чи була їм проведена вакцинація БЦЖ.

КОЛИ ПОТРІБНА ХІМІОПРОФІЛАКТИКА?

Хіміопрофілактика проводиться одноразово тривалим курсом 6 місяців щоденно одним препаратом ізоніазид у дозах, що відповідають масі тіла і віку дитини:

- дітям, у яких вперше в житті виявлена позитивна реакція Манту – так званий «віраж» туберкулінової проби (розмір папули 5 мм і більше);
- дітям і підліткам, які знаходились в контакті з хворим на туберкульоз, незалежно від результатів проби Манту;
- дітям і підліткам з гіперергічною реакцією на пробу Манту (17 мм і більше, з пухирцями (везикулою) на місці ін'єкції, з реакцією з боку лімфатичних судин та вузлів);
- дітям і підліткам, у яких результат проби Манту збільшився на 6 і більше мм в порівнянні з минулим роком, або протягом останніх років повільно наростиав щорічно на 1-3 мм.

5 причин, чому не варто відмовлятися від хіміопрофілактики.

1. Повноцінний курс хіміопрофілактики в 5-9 раз знижує ризик розвитку важких форм захворювання (туберкульоз центральної нервової системи, генералізований, дисемінований туберкульоз).
2. Профілактика проводиться лише одним протитуберкульозним препаратом (Ізоніазид) в профілактичній дозі протягом 6 місяців (лікування активної форми захворювання проводиться 4 препаратами не менше 6 місяців, дози ліків у цьому випадку більші за профілактичні).
3. Ізоніазид - найбільш ефективний і одночасно найбезлечніший протитуберкульозний препарат, а його застосування в профілактичних дозах, які розраховані точно по вазі Вашої дитини, майже не викликає побічних реакцій.
4. Спеціально для дітей випущений Ізоніазид у сиропі, який легко і точно дозується, має приємний смак, добре переноситься дітьми.
5. При первинному потраплянні в організм паличка Коха перші 2-3 місяці знаходиться поза клітинами. Саме для її пригнічення в цьому стані і проводиться хіміопрофілактика. В даному випадку вона найбільш ефективна. Коли мікобактерії потрапляють всередину клітин і сформують «сплячу» інфекцію, ефективність профілактики стане нижчою.

ЗАХИСТЬ СВОЮ ДИТИНУ ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ!


Відповідальна за випуск:
Л.П. Зубко, зав. відділом обласного Центру здоров'я

ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ФІЗІАТРІЯ»
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ'Я



ЦЕ ПОТРІБНО ЗНАТИ

Реакція Манту і профілактика туберкульозу



Вінниця 2016

